

Las instalaciones de recolección de sangre deben reducir el riesgo de recolectar sangre y componentes sanguíneos de un donante que pueda estar infectado con la enfermedad del Ébola. Es posible que una persona con la enfermedad del Ébola no tenga síntomas de infección durante el período de incubación. Además, cualquier persona que haya tenido ALGUNA VEZ la enfermedad del Ébola puede tener riesgo de transmitir la enfermedad del Ébola a través de la donación de sangre, independientemente del tiempo transcurrido desde la recuperación.

La enfermedad del Ébola se transmite de un ser humano a otro mediante el contacto directo con fluidos corporales (tales como sangre, orina, heces, saliva, semen, fluidos vaginales o vómito) de personas sintomáticas. Los trabajadores de la salud y los familiares y amigos que brindan atención o cuidado pueden tener una exposición directa a la sangre u otros fluidos corporales de pacientes enfermos. Si una persona se expone de manera directa, tiene un riesgo alto de desarrollar la enfermedad del Ébola y no debe donar sangre ni componentes sanguíneos.

NO DONE SANGRE si:

- Ha tenido ALGUNA VEZ la enfermedad del Ébola.
- En las ÚLTIMAS 8 SEMANAS, ha vivido en un país con un brote de la enfermedad del Ébola o ha viajado a alguno de ellos.
- En las ÚLTIMAS 8 SEMANAS, ha tenido contacto sexual con una persona que ha tenido ALGUNA VEZ la enfermedad del Ébola, incluyendo a una persona bajo investigación cuyo diagnóstico está pendiente.
- En las ÚLTIMAS 8 SEMANAS, ha estado expuesto de manera directa a los fluidos corporales (tales como sangre, orina, heces, saliva, semen, fluidos vaginales o vómito) de una persona con la enfermedad del Ébola, incluidos los fluidos corporales de una persona bajo investigación cuyo diagnóstico está pendiente.
- En las ÚLTIMAS 8 SEMANAS, una autoridad de salud pública le ha notificado que es posible que haya estado expuesto a una persona que tiene la enfermedad del Ébola.

PÓNGASE EN CONTACTO CON la Administración de donantes si desarrolla los siguientes síntomas dentro del período de 8 semanas posterior a la donación:

- | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| • Fiebre | Seguido/a de: | • Diarrea |
| • Dolor de cabeza intenso | | • Vómitos |
| • Dolor y debilidad muscular | | • Dolor abdominal |
| • Fatiga | | • Hemorragia (sangrado o hematomas) |